

# 1 接種方法等一覧

◆接種方法欄の太字・下線となっている部分については、接種量等に違いがありますので注意してください。

ワクチン名	※接種をお勧めする年齢（標準の接種対象年齢） <無料で受けられる年齢（接種対象年齢）>		接種方法 (接種量)
Hib (ヒブ)	初回	生後2か月～7か月未満の間に接種開始 <生後2か月～60か月〔5歳〕未満>	生後12か月までに27日～56日の間隔で3回皮下に接種（各0.5ml）
	追加	初回接種終了後、7か月～13か月の間 <生後2か月～60か月〔5歳〕未満>	1回皮下に接種（0.5ml）
小児用肺炎球菌	初回	生後2か月～7か月未満の間に接種開始 <生後2か月～60か月〔5歳〕未満>	生後12か月までに27日以上の間隔で3回皮下に接種（各0.5ml）
	追加	生後12～15か月 <生後2か月～60か月〔5歳〕未満>	初回接種終了後60日以上の間隔で1回皮下に接種（0.5ml）
B型肝炎	1回目、2回目	生後2か月、3か月 <生後～1歳未満>	27日以上の間隔で2回皮下に接種（各0.25ml）
	3回目	生後7～8か月 <生後～1歳未満>	<u>1回目接種後</u> 、139日以上の間隔で1回皮下に接種（0.25ml）
ロタウイルス	1回目をいずれかのワクチンで 生後2か月～生後14週6日後までに接種開始 <ロタリックス：生後6週0日後～生後24週0日後まで> <ロタテック：生後6週0日後～生後32週0日後まで>		ロタリックス：27日以上の間隔において <b>2回経口接種（各1.5ml）</b> ロタテック：27日以上の間隔において <b>3回経口接種（各2.0ml）</b>
四種混合 (DPT-IPV)  (D:ジフテリア P:百日せき T:破傷風 IPV:不活化ポリオ)	1期	初回接種 生後3か月～12か月 <生後3か月～90か月〔7歳6か月〕未満>	●四種混合・不活化ポリオ（単独）ワクチンの場合 20日～56日の間隔で3回皮下に接種（各0.5ml） ●二種混合ワクチンの場合 20日～56日の間隔で2回皮下に接種（各0.5ml）
		追加接種 初回接種終了後、12か月～18か月の間 <生後3か月～90か月〔7歳6か月〕未満>	1回皮下に接種（0.5ml） ※最短6か月以上の間隔で接種可
二種混合（DT） (ジフテリア 破傷風)	2期	11歳 <11歳～13歳未満>	1回皮下に接種（ <b>0.1ml</b> ）
B C G	生後5か月～8か月未満 <生後～1歳未満>		接種前に接種部位をアルコール消毒し、十分に乾かしたら、添付のスポンジで1滴を滴下し、上腕外側のほぼ中央部に、管針でワクチンを幅1.5cm、長さ3cm程度のぼした後、管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、上腕骨にむかって強く押す。接種数は、隣接する2か所とし、直射日光は避け、そのまま自然乾燥させる。
麻しん風しん 混合（MR） (麻しん、風しん)	1期	生後12か月～24か月未満 <同上>	●混合ワクチンの場合 1回皮下に接種（0.5ml）
	2期	小学校入学1年前の4月1日から 入学の年の3月31日までの間にある者 <同上> (平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれ)	●単独ワクチンの場合 各1回(27日以上あけて) 皮下に接種（各0.5ml）